



## ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນຫຍັງ?

ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນການຕິດເຊື້ອຕັບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບ B. ມັນສາມາດເປັນພະຍາດເບົາບາງທີ່ຫາຍໄດ້ສອງສາມອາທິດ, ຫຼື ເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຕະຫຼອດຊີວິດ.

1 ໃນ 4 ຄົນທີ່ເປັນໂຣກຕັບອັກເສບ B ຊຳເຮື້ອຈະເກີດມີບັນຫາຕັບທີ່ຮ້າຍແຮງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນມະເຮັງ, ແຕ່ສາມາດກວດພົບກ່ອນເພື່ອໃຫ້ມີການປິ່ນປົວ ແລະ ການຕິດຕາມ.


## ຕັບອັກເສບ B ມີການແຜ່ເຊື້ອໄດ້ແນວໃດ?

ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແຜ່ລາມຈາກຄົນສູ່ຄົນໂດຍການສຳຜັດກັບເລືອດ ຫຼື ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍທີ່ຕິດເຊື້ອ. ມັນສາມາດນຳສົ່ງເຊື້ອຈາກ:

- ຄົນຖືພາສູ່ລູກໃນເວລາເກີດ
- ການສຳຜັດກັບເລືອດຈາກຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກຕັບອັກເສບ B
- ຮ່ວມໃຊ້ສິ່ງຂອງການດູແລສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ແປງ ຖູແຂ້ວ, ມິດໂກນ, ມິດຕັດເລັບ, ຫຼື ອຸປະກອນທ່າງການແພດ (ເຊັ່ນ ເຄື່ອງກວດລະດັບນໍ້າຕານ) ກັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B.
- ການສຳຜັດຈາກການມີເພດສຳພັນ
- ຮ່ວມໃຊ້ຂີ້ມ, ເຂັມສັກຢາ, ຫຼື ອຸປະກອນກະກຽມຢາ

## ພະຍາດຕັບອັກເສບ B ບໍ່ໄດ້ແຜ່ຈາກ:

- ການກິນອາຫານ ຫຼື ການໃຊ້ເຄື່ອງກິນອາຫານ ຮ່ວມກັນ
- ການສຳຜັດເຊັ່ນ: ການກອດ, ການຈູບ ຫຼື ການຈັບມື
- ຜ່ານນໍ້າ ຫຼື ອາກາດ



## ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ)  
[www.cdc.gov/hepatitis/hbv/](http://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/)



DOH 420-405 May 2022 Lao  
ເພື່ອຂໍເອົາເອກະສານນີ້ໃນຮູບແບບອື່ນ, ໃຫ້ໂທ  
1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ຫຼຸໜວກ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນ, ກະລຸນາ  
ໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼື ອີເມວຫາ  
[civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).  
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Minnesota Department of Health, Hepatitis B

# ພະຍາດຕັບອັກເສບ B: ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນ ຄວນຮູ້





## ໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ?

ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າທ່ານເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນການໄປກວດ.

- ຄົນຖືພາທຸກຄົນຄວນກວດພະຍາດຕັບອັກເສບ B ເປັນປະຈຳ. ຖ້າຜູ້ຖືພາມີພະຍາດຕັບອັກເສບ B, ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ທັນເວລາສາມາດຊ່ວຍ ບໍ່ຮ້າງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດໄປສູ່ລູກໄດ້.
- ຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B.
- ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈະເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B, ອັນນີ້ລວມມີ:
  - ຄົນທີ່ເກີດຢູ່ໃນເຂດທີ່ມັກມີພະຍາດຕັບອັກເສບ B, ຫຼື ພໍ່ແມ່ທີ່ເກີດຢູ່ໃນເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນອາຟຣິກາ ຫຼື ອາຊີ
  - ຜູ້ທີ່ສັກຢາ
  - ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍ



## ໃຜທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາ ບ້ອງກັນພະຍາດ?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ແນະນຳໃຫ້ມີການສັກຢາບ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບຕັບ B ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ, ລວມເຖິງ:

- ເດັກເກີດໃໝ່ທັງໝົດ
- ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 59 ປີ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈຄວາມສ່ຽງໃດໆ
- ຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີປັດໃຈສ່ຽງເຊັ່ນ:
  - ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂດຍການສຳຜັດທາງເພດສຳພັນ
  - ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຈາກ ການສຳພັນກັບເລືອດຜ່ານທາງຜິວໜັງ ຫຼື ເຍື່ອເມືອກ
  - ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປເຂດທີ່ມີອັດຕາ ການຕິດເຊື້ອຕັບອັກເສບ B ປານກາງ ຫຼື ສູງ
  - ຄົນທີ່ມີພະຍາດຕັບຊຳເຮື້ອ
  - ຄົນທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ HIV
  - ຄົນທີ່ຖືກຄຸມຂັງ
  - ຄົນອື່ນໆທັງໝົດທີ່ຊອກຫາການບ້ອງກັນຈາກພະຍາດຕັບອັກເສບ B



### ປະມານ 296 ລ້ານຄົນ

ໃນທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ກັບການເປັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B, ແຕ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອເພາະບໍ່ຮູ້ສຶກ ຫຼື ບໍ່ສະແດງອາການທີ່ບໍ່ສະບາຍ.



## ຢາວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພບໍ?

ວັກຊີນບ້ອງກັນຕັບອັກເສບ B ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຖືກນຳໃຊ້ໃນສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ 1982 ມາແລ້ວ.

ວັກຊີນບ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຕື້ ເຂັ້ມໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ.

ປະຕິກິລິຍາທີ່ຝິບເລື້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບວັກຊີນແມ່ນອາການໄຂ້ໜ້ອຍ ຫາ ປານກາງ ແລະ ເຈັບປ່ວນສັກຢາ. ຜົນຂ້າງຄຽງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແກ່ຍາວເຖິງ 1-2 ມື້.



## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບ ຢາວັກຊີນບ້ອງກັນຕັບອັກເສບ B ຢູ່ໃສ?

ລົມກັບຮ້ານຂາຍຢາ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ຫຼື ພະແນກສາທາລະນະສຸກປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ. ຄລິນິກບາງແຫ່ງໃຫ້ວັກຊີນບ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B ຝຣີ ຫຼື ລາຄາຖືກ.

ການປະກັນໄພສຸຂະພາບອາດຈະຄຸ້ມຄອງທັງການສັກຢາວັກຊີນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 59 ປີ, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີທີ່ມີປັດໃຈຄວາມສ່ຽງ.

ຖ້າທ່ານເກີດລູກ, ລູກຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບວັກຊີນຕັບອັກເສບ B ຢູ່ໂຮງຫມໍກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກ. ຢາວັກຊີນນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່.